

登録No.

R-019

登録名

CDDP/VNR療法

催吐性リスク

高度

適応疾患

非小細胞肺癌

投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	パロノセトロン0.75mg ^{パツ} デキサメタゾン ホスネツピタント	50mL/body 9.9mg/body 235mg/body		d1	d.i.v.	30min	輸液総量の1.8倍量をDrip-eyeに設定
Rp.2	ビノレルピン 生食	25mg/m ² 50mL/body		d1、8	d.i.v.	5分	
Rp.3	生食	250mL/body		d8	d.i.v.	全開	ルートキープ&フラッシュ用
Rp.4	アクチット	500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.5	シスプラチン 生食	80mg/m ² 500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.6	マンニトール	300mL/body		d1	d.i.v.	30min	
Rp.7	アクチット	500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.8	生食	500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	

1クールの間

3週間

標準クール数

4クール（術後補助療法）

最大クール数

6クール（進行・再発癌）

休薬期間の規定

投与間隔短縮の規定

その他（副作用・PS規定等）

副作用：悪心・嘔吐、食欲不振、倦怠感、骨髄抑制、下痢、便秘、末梢神経障害、聴力障害、静脈炎など

ECOG PS：0～1

d2-d4はデキサメタゾン錠4mg 1回1錠 1日2回 朝昼食後服用

腎機能障害予防のためd2-d3の飲水を指導（1日1000mL以上）