

登録No. S-012  
 登録名 CPT-11/経口抗癌剤  
 催吐性リスク 中等度+オプション  
 適応疾患 胃癌・結腸癌・直腸癌  
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
I 法							
Rp.1	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d1・15	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.2	イリノテカン 生食	150mg/m <sup>2</sup> 500mL/body		d1・15	d.i.v.	90min	
Rp.3	UFT	300mg/m <sup>2</sup> /day		d1~28	p.o.	分2~3	4週服用1週休薬2クール以上施行
II 法							
Rp.4	グラニセトロンバッグ デカドロン	100mL/body 4.95mg/body		d1・15	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.5	イリノテカン 生食	150mg/m <sup>2</sup> 500mL/body		d1・15	d.i.v.	90min	
Rp.6	ドキシフルリジン	800mg/m <sup>2</sup> /day		d3~14・ d17~28	p.o.	分3~4	d1~2・d15~16・ d29~35休薬

1クールの期間 5週間  
 その他（副作用・PS規定等）