

登録No. S-019
 登録名 S-1/PAC療法1,2法
 催吐性リスク 軽度
 適応疾患 胃癌
 投与スケジュール

| | 薬剤 | 投与量 | 最大投与量 | 投与日 | 投与経路 | 投与時間 | 備考 |
|------|--|---|-------|---------|--------|------------|-------------------------------------|
| 1法 | | | | | | | |
| Rp.1 | S-1 | 基準量 | | d1~14 | p.o. | 分2 朝夕食後 | 2週投与2週休薬 |
| Rp.2 | ファモチジン デキサメタゾン マリン酸カルフェラミン 生食 | 20mg/body 6.6mg/body 5mg/body 100mL/body | | d1・8・15 | d.i.v. | 30min | 前投薬 |
| Rp.3 | パクリタキセル 生食 | 50mg/m ² 250mL/body | | d1・8・15 | d.i.v. | 1hr | 粘調度高いため、輸液総量の 1.5倍量をDrip-eyelに設定 |
| 2法 | | | | | | | |
| Rp.1 | S-1 | 基準量 | | d1~14 | p.o. | 分2 朝夕食後 | 2週投与1週休薬 |
| Rp.2 | ファモチジン デキサメタゾン マリン酸カルフェラミン 生食 | 20mg/body 6.6mg/body 5mg/body 100mL/body | | d1・8 | d.i.v. | 30min | 前投薬 |
| Rp.3 | パクリタキセル 生食 | 50mg/m ² 250mL/body | | d1・8 | d.i.v. | 1hr | 粘調度高いため、輸液総量の 1.5倍量をDrip-eyelに設定 |

1クルルの期間 1法：4週間
 2法：3週間

その他（副作用・PS規定等）

1法、2法どちらでも良いが、まず2法から開始。
 副作用：骨髄抑制、消化器症状など。
 PS：0~1
 パクリタキセル初回投与時、心電図モニター装着。
 メンブランフィルター（0.22μm）付きDEHPfreeの輸液セットを用いて投与。