

登録No. S-054
 登録名 分割DCS療法
 催吐性リスク 高度
 適応疾患 胃癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	S-1	80mg/m ² /day		d1~d14	p.o.	分2朝・夕	2週投与2週休薬
Rp.2	KN3号	1000mL/body		d0・d2・ d14・d16	d.i.v.	4hr	
Rp.3	ラクテック	500mL/body		d1・d15	d.i.v.	2hr	
Rp.4	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d1・d15	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.5	ドセタキセル 生食	35mg/m ² 250mL/body		d1・d15	d.i.v.	1hr	粘調度高いため、輸液総量の 1.5倍量をDrip-eyeに設定
Rp.6	シスプラチン 生食	35mg/m ² 500mL/body		d1・d15	d.i.v.	2hr	
Rp.7	ラクテック フロセミド	500mL/body 20mg/body		d1・d15	d.i.v.	2hr	

1クールの間 4週間
 その他（副作用・PS規定等）

副作用：骨髄抑制・悪心嘔吐・食欲不振・脱毛
 悪心・嘔吐時：プロモプラザン1A、ハルリドール1/2A、デキサメタゾン3.3mgなどを生食100mLに
 尿量減少時：フロセミド 20mg i.v.
 3日間入院必要