

登録No. S-003  
 登録名 S-1/Low-dose CDDP療法  
 催吐性リスク 高度  
 適応疾患 胃癌・食道癌・膵癌・結腸癌・直腸癌・胆道癌  
 投与スケジュール

|      | 薬剤                    | 投与量                                  | 最大投与量 | 投与日               | 投与経路   | 投与時間       | 備考        |
|------|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|--------|------------|-----------|
| I 法  |                       |                                      |       |                   |        |            |           |
| Rp.1 | S-1                   | 基準量                                  |       | d1~d21            | p.o.   | 分2<br>朝夕食後 | 3週投与2週休薬  |
| Rp.2 | パロノセトロンバッグ<br>デキサメタゾン | 50mL/body<br>9.9mg/body              |       | d1~d3 or<br>d1~d5 | d.i.v. | 30min      | アプレピタント併用 |
| Rp.3 | シスプラチン<br>生食          | 3~20mg/m <sup>2</sup><br>500mL/body  |       | d1~d3 or<br>d1~d5 | d.i.v. | 2hr        |           |
| Rp.4 | ラクテック                 | 500mL/body                           |       | d1~d3 or<br>d1~d5 | d.i.v. | 2hr        | 場合により不要   |
| II 法 |                       |                                      |       |                   |        |            |           |
| Rp.1 | S-1                   | 基準量                                  |       | d1~d21            | p.o.   | 分2<br>朝夕食後 | 3週投与2週休薬  |
| Rp.2 | パロノセトロンバッグ<br>デキサメタゾン | 50mL/body<br>9.9mg/body              |       | d1・8・15           | d.i.v. | 30min      | アプレピタント併用 |
| Rp.3 | シスプラチン<br>生食          | 15~20mg/m <sup>2</sup><br>500mL/body |       | d1・8・15           | d.i.v. | 2hr        |           |
| Rp.4 | ラクテック                 | 500mL/body                           |       | d1・8・15           | d.i.v. | 2hr        | 場合により不要   |

1クールの間 5週間  
 その他（副作用・PS規定等）

胃癌：PR61%