

登録No. S-014
 登録名 IFL療法 (IFL変法、Saltz変法)
 催吐性リスク 中等度+オプション
 適応疾患 結腸癌・直腸癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Saltz変法							
Rp.1	グラニセトロン ^{バツガ} デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d1・8・ 15・22	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.2	イリノテカン 生食	100mg/m ² 500mL/body		d1・8・ 15・22	d.i.v.	90min	
Rp.3	レボホリナート 生食	10mg/m ² 50mL/body		d1・8・ 15・22	d.i.v.	全開	イリノテカン終了後
Rp.4	5-FU 生食	500mg/m ² 50mL/body		d1・8・ 15・22	d.i.v.	全開	
IFL変法							
Rp.5	グラニセトロン ^{バツガ} デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.6	レボホリナート ラクテック	250mg/m ² 500mL/body		d1・8・15	d.i.v.	2hr	
Rp.7	5-FU 生食	500mg/m ² 50mL/body		d1・8・15	d.i.v.	全開	レボホリナート開始1時間後投与
Rp.8	イリノテカン 生食	80mg/m ² 500mL/body		d1・8・15	d.i.v.	90min	

1クルルの期間 Saltz変法： 6週間
 IFL変法： 4週間

その他 (副作用・PS規定等) Saltz変法： 週1回4週投与と2週休薬で1クール (3投1休 or 3投2休でも可)
 IFL変法： 週1回3週投与と1週休薬で1クール