

登録No. S-051  
 登録名 Bevacizumab/XELOX療法  
 催吐性リスク 中等度  
 適応疾患 結腸・直腸癌  
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	ベバシズマブ 生食	7.5mg/kg 100mL/body	7.5mg/kg -	d1	d.i.v.	初回90min (忍容性良好なら 2回目60min 忍容性良好なら 3回目以降 30min でも可。)	ブドウ糖液禁 ワンショット静注禁
Rp.2	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100mL/body 9.9mg/body		d1	d.i.v.	30min	
Rp.3	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body		d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン前 末梢神経障害予防
Rp.4	オキサリプラチン 5%糖液	130mg/m <sup>2</sup> 250mL/body		d1	d.i.v.	2hr	血管痛あればデキサメタ ゾン1.65mg混注
Rp.5	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body		d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン後
Rp.6	カペシタビン	BSA1.36m <sup>2</sup> 未満 2400mg/body/day 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満 3000mg/body/day 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 3600mg/body/day 1.96m <sup>2</sup> 以上 4200mg/body/day		d1夕～ d15朝	p.o.	分2朝夕	副作用による減量規定あ り14日投与7日休薬

1クールの間 3週間  
 その他（副作用・PS規定等）

副作用

- ①消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓、高血圧性脳症、アナフィラキシーショック等
  - ②末梢神経障害、しびれ、骨髄抑制、消化器症状、HandFoot syndrome、好中球1500以上、血小板7.5万以上で投与可。
- 減量規定あり。  
 DEHPフリーのルートを使用。