

登録No. S-064
 登録名 SOX療法
 催吐性リスク 中等度
 適応疾患 結腸・直腸癌・胃癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	S-1	基準量		d1~14	p.o.	分2朝夕食後	2週投与1週休薬
Rp.2	グラニセトロンパ [®] ック デキサメタゾン	100mL/body 9.9mg/body		d1	d.i.v.	30min	
Rp.3	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body		d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン前 末梢神経障害予防
Rp.4	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	血管痛が起きたらデキサメタ ゾン1.65mg混注。
Rp.5	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body		d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン後

1クールの間 3週間
 その他（副作用・PS規定等）

重篤な副作用： 骨髄抑制(血小板減少、好中球減少など)、DIC、末梢神経障害、ショック、アナフィラキシー
 間質性肺炎、下痢など。

減量基準：

項目	基準	S-1	L-OHP
WBC	<1000	-1段階	-1段階
Neu	<500	-1段階	-1段階
Plt	<5万	-1段階	-1段階
	≥5万、<7.5万	—	-1段階
	次J-1開始予定日 ≥7.5万、<10万	—	-1段階
下痢	Grade3以上	-1段階	—