

登録No. S-082
 登録名 Bevacizumab/SOX療法
 催吐性リスク 中等度
 適応疾患 結腸・直腸癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	S-1	基準量		d1夕～15朝	p.o.	分2朝夕食後	2週投与1週休薬
Rp.2	ベバシズマブ 生食	7.5mg/kg 100mL/body	7.5mg/kg -	d1	d.i.v.	初回90min (忍容性良好なら 2回目60min 忍容性良好なら 3回目以降 30min でも可。)	ブドウ糖液禁 ワンショット静注禁
Rp.3	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100mL/body 9.9mg/body		d1	d.i.v.	30min	
Rp.4	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body		d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン前 末梢神経障害予防
Rp.5	オキサリプラチン 5%糖液	130mg/m ² 500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	血管痛あればデキサメ タゾン1.65mg混注
Rp.6	グルコン酸Ca 硫酸Mg 5%ブドウ糖液	10mL/body 10mL/body 50mL/body		d1	d.i.v.	15min	オキサリプラチン後

1クールの間 3週間
 その他（副作用・PS規定等）

副作用： 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓、高血圧性脳症、アナフィラキシーショック、骨髄抑制(血小板減少、好中球減少など)
 DIC、末梢神経障害、間質性肺炎、下痢など。

減量基準：	項目	基準	S-1	L-OHP
	WBC	<1000	-1段階	-1段階
	Neu	<500	-1段階	-1段階
	Plt	<5万	-1段階	-1段階
		≥5万、<7.5万	—	-1段階
		次J-7開始予定日 ≥7.5万、<10万	—	-1段階
	下痢	Grade3以上	-1段階	—