

登録No. U-004
 登録名 M-VAC療法
 催吐性リスク 高度
 適応疾患 尿路上皮癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	ラクテック	500mL/body		d1	メイン d.i.v	5hr	
Rp.2	メトトレキサート 生食	30mg/m ² 100mL/body		d1	側管 d.i.v.	30min	ラクテックと同時に開始
Rp.3	ラクテック	1500mL/body		d2	メイン d.i.v	3hr	
Rp.4	ピンプラスチン 生食	3mg/m ² 100mL/body		d2	側管 d.i.v.	30min	ラクテック1本目と同時に開始
Rp.5	5%ブドウ糖液	500mL/body		d2	メイン d.i.v	2hr	
Rp.6	ドキソルピシン 生食	30mg/m ² 100mL/body		d2	側管 d.i.v.	30min	5%ブドウ糖液と同時に開始
Rp.7	マンニトール	100mL/body		d2	メイン d.i.v	30min	
Rp.8	パロノセトロンバッグ デカドロン	50mL/body 9.9mg/body		d2	側管 d.i.v.	30min	マンニトールと同時に開始 アプレピタント併用
Rp.9	シスプラチン 生食	70mg/m ² 500mL/body		d2	メイン d.i.v	3hr	
Rp.10	ラクテック	500mL/body		d2	メイン d.i.v	5hr	
Rp.11	ラクテック	500mL/body		d2	メイン d.i.v	5hr	
Rp.12	ラクテック	500mL/body		d15・22	メイン d.i.v	5hr	
Rp.13	メトトレキサート 生食	30mg/m ² 100mL/body		d15・22	側管 d.i.v.	30min	ラクテックと同時に開始
Rp.14	ピンプラスチン 生食	3mg/m ² 100mL/body		d15・22	側管 d.i.v.	30min	メトトレキサート終了後に投与

1クルの期間 4週間
 その他（副作用・PS規定等）

ドキソルピシンの総投与量は500mg/m²以下