

登録No. U-010
 登録名 GC療法(CCr50~59)
 催吐性リスク 高度
 適応疾患 尿路上皮癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d1	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.2	デキサメタゾン 生食	6.6mg/body 50mL/body		d8・15	d.i.v.	30min	
Rp.3	ゲムシタピン 5%ブドウ糖液	1000mg/m ² 100mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	
Rp.4	生食	500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.5	マンニトール	300mL/body		d1	d.i.v.	30min	必要に応じて投与
Rp.6	シスプラチン 生食	35mg/m ² 500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.7	マンニトール	300mL/body		d1	d.i.v.	30min	必要に応じて投与
Rp.8	生食	500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.9	アクチット	500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.10	アクチット	500mL/body		d1	d.i.v.	2hr	
Rp.11	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.12	デキサメタゾン 生食	9.9mg/body 50mL/body		d2	d.i.v.	30min	
Rp.13	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	必要に応じて投与
Rp.14	シスプラチン 生食	35mg/m ² 500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.15	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	必要に応じて投与
Rp.16	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.17	アクチット	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.18	生食	500mL/body		d3・4	d.i.v.	2hr	
Rp.19	アクチット	500mL/body		d3	d.i.v.	2hr	
Rp.20	生食	500mL/body		d3・4	d.i.v.	2hr	

1クールの間 4週間
 その他（副作用・PS規定等）

d1よりアプレピタント内服
 2コース毎に評価。
 副作用：血小板減少・白血球減少・倦怠感・悪心・便秘・脱毛
 中止基準：WBC2000未満または血小板7万未満の場合は骨髓機能回復するまで延期。
 CCr50~59のときシスプラチンは2日間以上に分割して100%DOSE投与。
 CCr50未満のときシスプラチン休薬
 KPS70以上で適用。