

登録No. U-022  
 登録名 GCarbo療法  
 催吐性リスク 高度  
 適応疾患 尿路上皮癌  
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	デキサメタゾン 生食	6.6mg/body 50mL/body		d1・8	d.i.v.	30min	
Rp.2	ゲムシタピン 5%ブドウ糖液	1250mg/m <sup>2</sup> 100mL/body		d1・8	d.i.v.	30min	30分以上かけて投与すると副作用増強の恐れあり
Rp.3	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.4	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d2	d.i.v.	30min	アブレピタント併用
Rp.5	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	
Rp.6	カルボプラチン 生食	AUC5 250mL/body		d2	d.i.v.	1hr	
Rp.7	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	
Rp.8	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.9	アクチット	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.10	生食	500mL/body		d3・4	d.i.v.	2hr	
Rp.11	アクチット	500mL/body		d3	d.i.v.	2hr	
Rp.12	生食	500mL/body		d3・4	d.i.v.	2hr	

1クールの間 3週間  
 その他（副作用・PS規定等）

副作用：貧血・白血球減少・血小板減少・発熱性好中球減少症  
 開始基準：WBC：3000以上、Neutr：1500以上、血小板：10万以上、30<GFR<60  
 dose down基準：以下の場合はGEM：50% dose^  
 WBC：1000~1900、Neutr：500~1000、血小板：5~9.9万  
 以下の場合はCBDCA、GEMとも75% dose^  
 骨髄抑制が2週間以上遷延、発熱性好中球減少症、  
 血小板がNadirの間に出血症状が出た場合、3日間以上のG4の血小板低下  
 PS：2以下