

登録No. U-023  
 登録名 GCarbo療法 (PS低下時)  
 催吐性リスク 高度  
 適応疾患 尿路上皮癌  
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	デキサメタゾン 生食	6.6mg/body 50mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	
Rp.2	ゲムシタピン 5%ブドウ糖液	800mg/m <sup>2</sup> 100mL/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	30分以上かけて投与すると副作用増強の恐れあり
Rp.3	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.4	パロノセトロンバック デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d2	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.5	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	
Rp.6	カルボプラチン 生食	AUC4 250mL/body		d2	d.i.v.	1hr	
Rp.7	マンニトール	300mL/body		d2	d.i.v.	30min	
Rp.8	生食	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.9	アクチット	500mL/body		d2	d.i.v.	2hr	
Rp.10	生食	500mL/body		d3, 4	d.i.v.	2hr	
Rp.11	アクチット	500mL/body		d3	d.i.v.	2hr	
Rp.12	生食	500mL/body		d3, 4	d.i.v.	2hr	

1クールの間 4週間

その他 (副作用・PS規定等)

副作用：貧血・白血球減少・血小板減少・肝機能障害・吐き気・脱毛  
 開始基準：WBC：3500以上、Neutr：1500以上、血小板：10万以上、40<GFR  
 PS：2以下