

登録No. S-011
 登録名 CPT-11療法
 催吐性リスク 中等度+オプション
 適応疾患 胃癌・結腸癌・直腸癌、乳癌（A法のみ）
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
A法							
Rp.1	グラニセトロンパ ッグ デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.2	イリノテカン 生食	70~120mg/m ² 500mL/body		d1・8・15	d.i.v.	90min	週1回 3週投与1週休薬
Rp.3	ラモセトロンOD錠	2T/body/day			p.o.	分2	必要時
B法							
Rp.1	グラニセトロンパ ッグ デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d1・15・ (29)	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.2	イリノテカン 生食	150mg/m ² 500mL/body		d1・15・ (29)	d.i.v.	90min	週1回 2週間隔で2~3回 投与、2週休薬
Rp.3	ラモセトロンOD錠	2T/body/day			p.o.	分2	必要時
C法							
Rp.1	グラニセトロンパ ッグ デキサメタゾン	100mL/body 4.95mg/body		d1~3・ d8~10	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.2	イリノテカン 生食	30~40mg/m ² 500mL/body		d1~3・ d8~10	d.i.v.	90min	1日1回3日連投 2週続け2週休薬
Rp.3	ラモセトロンOD錠	2T/body/day			p.o.	分2	必要時

1クルールの期間 A法：4週間
 B法：5~7週間
 C法：4週間

その他（副作用・PS規定等）