

登録No. S-047  
 登録名 TC療法  
 催吐性リスク 中等度  
 適応疾患 乳癌  
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d1	d.i.v.	30min	
Rp.2	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL/body		d1	d.i.v.	60min	
Rp.3	シクロフォスファミド 生食	600mg/m <sup>2</sup> 250mL/body		d1	d.i.v.	60min	
Rp.4	ジーラスタ皮下注 ポディーポッド	3.6mg/body		d1	s.c.		
Rp.5	生食注シリンジ	1筒/body		d1	s.c.		

1クールの間 3週間  
 標準クール数 4クール  
 最大クール数  
 休薬期間の規定  
 投与間隔短縮の規定  
 その他（副作用・PS規定等）

副作用：骨髄抑制、嘔気、脱毛  
 ・血管外漏出に注意。

【更新】 22.2.18 適応の分類に「再発低リスク・心疾患既往患者の」の文言を追記  
 2024.4.16 制吐薬適正使用ガイドライン改訂に伴い制吐剤変更  
 2026.2.19ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド追加。