

登録No. G-019  
 登録名 Pembrolizumab/FP療法  
 催吐性リスク 高度  
 適応疾患 食道癌  
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	ペムブロリズマブ 生食	①200mg/body ②400mg/body 100mL/body		d1	C.V.	30min	インラインフィルター (0.2又は0.22μm)使用
Rp.2	生食	50mL/body		d1	C.V.	全開	ペムブロリズマブフラッシュ用
Rp.3	KN3号 硫酸マグネシウム	500mL/body 20mEq/body		d1	C.V.	2hr	
Rp.4	KN3号	500mL/body		d1	C.V.	2hr	
Rp.5	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75mg/body 9.9mg/body 235mg/body		d1	C.V.	30min	輸液総量の1.8倍量をDrip-eyeに設定
Rp.6	マンニトール	300mL/body		d1	C.V.	30min	
Rp.7	デキサメタゾン 生食	6.6mg/body 50mL/body		d2~5	C.V.	30min	
Rp.8	フルオロウラシル ソルアセトD	800mg/m <sup>2</sup> 500mL/body		d1~d5	C.V.	24時間持続	
Rp.9	シスプラチン 生食	80mg/m <sup>2</sup> 500mL/body		d1	C.V.	2hr	
Rp.10	ラクテック	500mL/body		d1	C.V.	2hr	
Rp.11	ラクテック	500mL/body		d1	C.V.	2hr	
Rp.12	KN3号	500mL/body		d2~d5	C.V.	2hr	
Rp.13	KN3号	500mL/body		d2~3	C.V.	2hr	

1クールの間 3週間 (ペムブロリズマブ①3週間、②6週間)  
 標準クール数  
 最大クール数 PDまで (シスプラチン：6クール、ペムブロリズマブ、フルオロウラシル：35クール)  
 休業期間の規定  
 投与間隔短縮の規定  
 その他 (副作用・PS規定等)

開始基準： PS：0-1、好中球数 $\geq 1,500/\mu\text{L}$ 、血小板 $\geq 10万/\mu\text{L}$ 、Hb $\geq 9.0g/\mu\text{L}$ 、SCr $\leq 1.5\times\text{ULN}$  ( $>1.5\times\text{ULN}$ の時、CCr $\geq 60\text{mL}/\text{min}$ )  
 T-Bil $\leq 1.5\times\text{ULN}$  ( $1.5\times\text{ULN}$ の時、D-Bil $\leq\text{ULN}$ )、AST,ALT $\leq 2.5\times\text{ULN}$  (肝転移時 $\leq 5\times\text{ULN}$ )  
 INR,aPTT $\leq 1.5\times\text{ULN}$  (抗凝固薬使用可)  
 減量・休業・中止基準： KEYNOTE-590試験を参照  
 副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、味覚異常、下痢、便秘、腎障害、聴力障害、末梢神経障害、  
 インフュージョンリアクション、irAEなど