

登録No. S-003
 登録名 S-1/Low-dose CDDP療法
 催吐性リスク 高度
 適応疾患 胃癌・食道癌・膵癌・結腸癌・直腸癌・胆道癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
I 法							
Rp.1	S-1	基準量		d1~d21	p.o.	分2 朝夕食後	3週投与2週休薬
Rp.2	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d1~d3 or d1~d5	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.3	シスプラチン 生食	3~20mg/m ² 500mL/body		d1~d3 or d1~d5	d.i.v.	2hr	
Rp.4	ラクテック	500mL/body		d1~d3 or d1~d5	d.i.v.	2hr	場合により不要
II 法							
Rp.1	S-1	基準量		d1~d21	p.o.	分2 朝夕食後	3週投与2週休薬
Rp.2	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d1・8・15	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.3	シスプラチン 生食	15~20mg/m ² 500mL/body		d1・8・15	d.i.v.	2hr	
Rp.4	ラクテック	500mL/body		d1・8・15	d.i.v.	2hr	場合により不要

1クールの間 5週間
 その他（副作用・PS規定等）

胃癌：PR61%