

登録No. S-004
 登録名 S-1/CDDP療法
 催吐性リスク 高度
 適応疾患 食道癌・胃癌・結腸癌・直腸癌・膀胱癌・胆道癌
 投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	S-1	基準量		d1~d21	p.o.	分2 朝夕食後	3週投与2週休薬
Rp.2	KN3号	500mL/body		d8	d.i.v.	2hr	
Rp.3	ラクテック	500mL/body		d8	d.i.v.	2hr	
Rp.4	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d8	d.i.v.	30min	アプレピタント併用
Rp.5	シスプラチン 生食	60mg/m ² 500mL/body		d8	d.i.v.	2hr	
Rp.6	マンニトール	300mL/body		d8	d.i.v.	1hr	
Rp.7	ラクテック	1000mL/body		d8	d.i.v.	4hr	
Rp.8	KN3号	1000mL/body		d7・9	d.i.v.	4hr	

1クールの間 5週間
 その他（副作用・PS規定等）

S-1 2週投与2週休薬の1クール4週でも可
 畜尿あり：12時間で尿量1000mL以下の時フロセミド20mg iv
 悪心・嘔吐時：プロクロルペラジン1A、ハロペリドール1/2A、
 デキサメタゾン3.3mgなどを生食100mL30分投与で対処