

登録No.

G-009

登録名

GC療法 Short Hydration

催吐性リスク

中等度

適応疾患

胆道癌

投与スケジュール

	薬剤	投与量	最大投与量	投与日	投与経路	投与時間	備考
Rp.1	パロノセトロン0.75mg ^ハ ック デキサメタゾン	50mL/body 9.9mg/body		d1、8	d.i.v.	30min	
Rp.2	ゲムシタピン 5%ブドウ糖液	1000mg/m ² 100mL/body		d1、8	d.i.v.	30min	60分以上かけると副作用増強のおそれあり
Rp.3	KN1号	500mL/body		d1、8	d.i.v.	1hr	
Rp.4	シスプラチン 生食	25mg/m ² 250mL/body		d1、8	d.i.v.	1hr	
Rp.5	生食	500mL/body		d1、8	d.i.v.	1hr	

1クールの間

3週間

その他（副作用・PS規定等）

副作用：骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、聴力障害

ECOG PS：0~1および2の一部良好な症例

【コース開始基準(d1)】

Neutr \geq 1500/mm³、Plt \geq 10万/mm³、T-Bil \leq 3 \times ULN、AST/ALT \leq 5 \times ULN、Scr \leq 1.5 \times ULN、Ccr \geq 45mL/min

【コース内の開始基準(d8)】

Neutr \geq 1000/mm³、Plt \geq 7万/mm³、T-Bil \leq 3 \times ULN、AST/ALT \leq 5 \times ULN、Ccr \geq 45mL/min

【減量基準】

Neutr $<$ 500/mm³、Plt $<$ 2万/mm³、AST/ALT $>$ 10 \times ULN、 \rightarrow GEM：1000mg/m² \rightarrow 800mg/m²、CDDP：変更なし
Scr $>$ 1.5 \times ULN、末梢神経障害G2以上、難聴・聴力障害G2以上 \rightarrow GEM：変更なし、CDDP：休薬