

Bev/Weekly PAC療法用トレーニングレポート

報告日 年 月 日

当院からの情報提供書に対する返信 その他

【注意】このFAXによる情報提供は**疑義照会ではありません。**

埼玉石心会病院 薬剤部 FAX番号：04-2003-8816

*太枠内をご記入下さい。

埼玉石心会病院

担当医 科 先生 御机下

この情報提供を行うことに対して患者または代諾者の同意を得ております。

患者、代諾者の同意は得ておりませんが、治療上必要性があるため報告します。

聞き取り日： 年 月 日

聞き取り方 来局時 電話 その他 ()

【患者】

来局日：

氏名：

生年月日：

性別：

【情報提供元保険薬局】

名称：

電話番号：

FAX：

保険薬剤師氏名：

㊞

【Bev/Weekly PAC療法で起こりやすい副作用】

悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、味覚異常、口内炎、末梢神経障害、爪障害、高血圧、鼻出血、蛋白尿など

・支持療法は正しく使用できているか

服用状況 用法通り服用できた 服用していない

服用できていない理由

・悪心：点滴した日から本日までムカムカして吐きたいような気分になることはありましたか？

なかった

少しあった (いつ： どんな時：何回くらい： 回)

今は治まったが辛かった (いつ： どんな時：何回くらい： 回)

本日も吐きたい気分 (どんな時： 食事がとれない 水分が摂れない 食事・水分は摂れる)

・嘔吐：点滴した日から本日まで吐いてしまうことはありましたか？

なかった

少しあった (いつ： どんな時：何回くらい： 回)

今は治まったが辛かった (いつ： どんな時：何回くらい： 回)

本日も吐いた (どんな時： 食事がとれない 水分が摂れない 食事・水分は摂れる)

・食欲不振

いつもと変わらない

食事は変わらないが、何となく食欲は落ちた

食事摂取量 低下 (いつから： いつもと比べて何%：)

食事摂取量 増加 (いつから： いつもと比べて何%：)

・下痢 泥状便や水様便はありましたか？

なかった

あった（いつ： 1日何回： 回 便の形： ）

今も下痢が続いている（朝から何回： 回 便の形： ）

下痢をしていたら下記聴取

同居人に下痢をしている人がいる いる いない

下剤を服用している 最終服用： 月 日 朝昼夕寝る前

昨日、生ものなど変わった食べ物を食べた はい いいえ

強い腹痛がある はい いいえ

普段の排便状況

眩暈や頭痛が続いている

1日以上水分がほとんど摂れていない

1	コロコロ便		硬くてコロコロの 塊糞状の便
2	硬い便		ソーセージ状であるが 硬い便
3	やや硬い便		表面にひび割れのある ソーセージ状の便
4	普通便		表面がなめらかで柔らかい ソーセージ状、あるいは 蛇のようなとぐるを巻く便
5	やや軟らかい便		はっきりとしたしわのある 柔らかい半分固形の便
6	泥状便		境界がぼけて、ふにやふに の不定形の小片便 泥状の便
7	水様便		水様で、固形物を含まない 液体状の便

・便秘 排便がない日が続いたり、硬い便がでていましたか？

なかった

あった（いつ： 1日何回： 回 便の形： ）

今も便秘が続いている（服用している下剤名： 1回 錠(Cap) 1日 回 ）

・味覚異常 なし あり（どんな状態：）

・口内炎 なし あり（場所： 疼痛の有無：あり なし）

・末梢神経障害

なかった

点滴後数日程度あった

生活に支障のない持続する症状（範囲： ）

生活に影響する強い症状（範囲： 疼痛の有無：あり なし）

・爪障害

なかった

あった・今も症状あり（脆弱化 爪の浮き 二枚爪）

・高血圧

自宅での血圧測定なし

自宅での血圧測定あり（収縮期血圧： mmHg 拡張期血圧： mmHg）

服用中の降圧剤の有無

なし

あり（降圧剤名： 1回 錠(Cap) 1日 回）

・鼻出血

なかった

鼻をかむとティッシュに付く程度の出血

圧迫止血で止まる軽度な出血

圧迫止血で止まらない重度な出血

・その他の症状

・薬学の介入事項

埼玉石心会病院 薬剤部 FAX番号：04-2003-8816